

Installation du Pigeon ramier *Columba palumbus excelsa* dans la palmeraie de Figuig

Jacques FRANCHIMONT

Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22 – 50.000 Meknès V.N. (Maroc)
j.franchimont@live.fr

Disponible en ligne (Available online) : 24 avril 2015

L'après-midi du 11 avril 2015, je fus surpris d'entendre retentir le chant du Pigeon ramier (*Columba palumbus*) dans la palmeraie de Figuig, située au sud-est du Maroc dans l'Atlas Saharien et aux confins algériens, à environ 900 m d'altitude. Une approche prudente me permit de réaliser quelques clichés de l'oiseau, perché sur un palmier. Un second oiseau adulte fut aussi repéré non loin de là, laissant supposer qu'un couple reproducteur était installé et cantonné dans cette zone.

Le lendemain matin, un troisième oiseau fut aperçu au vol dans une autre partie de la palmeraie. La palmeraie de Figuig est donc particulièrement riche en espèces de Columbides, puisque y étaient également établis lors de ma visite : la Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) dont plusieurs chanteurs venaient juste de se réinstaller, la Tourterelle maillée (*Spilopelia senegalensis*) espèce sédentaire en expansion d'origine algérienne, et la Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*), espèce sédentaire en expansion d'origine européenne.

La bibliographie compulsée ne renseigne aucunement le Pigeon ramier dans l'Atlas Saharien marocain. Thévenot *et al.* (2003) le mentionnent nicheur dans tout le nord du pays, au sud jusqu'au Haut Atlas, au Haouz, au Souss et à l'Anti-Atlas, mais, à l'est du pays, la limite de nidification connue ne dépasserait pas les monts du Maroc Oriental (Debdou), quelques rares mouvements

hivernaux étant détectés jusque dans le Tizi-n-Test et dans les Gorges du Ziz. Du côté algérien, Isenmann & Moali (2000) ne renseignent l'espèce nidificatrice que du nord du pays, avec comme limite sud-ouest les Monts de Tlemcen, bien loin au nord de Figuig. L'aire de distribution du Pigeon ramier figurant sur Wikipédia (fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_ramier) confirme également l'absence de l'espèce en temps que reproductrice de la région de l'Atlas Saharien marocain et sud-ouest algérien.

Bien que la région de Figuig soit relativement peu visitée par les ornithologues et que le Pigeon ramier n'y ait probablement jamais été vraiment recherché, il est possible qu'il s'y soit installé déjà depuis quelque temps. L'espèce, initialement plutôt forestière, fait preuve en Europe comme parfois dans le nord du Maroc d'une très grande adaptation aux milieux anthropisés et urbains (parcs de Rabat par exemple).

Relativement discret, ce pigeon s'avère peut-être plus facilement repérable au printemps lorsqu'il chante. Il va sans dire que, comme pour beaucoup d'espèces animales, la palmeraie de Figuig, véritable oasis verdoyante et riche en eau en pleine zone désertique, représente un site de choix pour l'installation de ce pigeon. L'avenir nous dira sans doute si sa récente colonisation de la palmeraie pourra se maintenir et si la population de cette espèce pourra y croître durablement.

Bibliographie

Isenmann, P. & Moali, A. 2000. *Oiseaux d'Algérie. Birds of Algeria*. SEOF, Paris.

Thévenot, M. ; Vernon, R. & Bergier, P. 2003. *The birds of Morocco*. BOU Checklist Series: 20.

fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_ramier#/media/File:Columba-palumbus-dist.png

